


# 일반약 복용지도 참고사항



## 피로회복제 (caffeine 함유)

- 1일 1병 이상 먹지 마십시오.
- 위·십이지장궤양 환자는 먹지 마십시오.
- 속쓰림이 나타날 수 있습니다.
- 공복시에는 복용하지 마십시오.

## 마시는 소화제

- 1일 3회 식후에 복용하십시오.
- 위궤양, 십이지장궤양 환자는 증상이 악화될 수 있습니다.
- 임신부·수유부는 주의하여야 합니다.

## 제산제등 현탁액

- 흔들어서 복용하며, 햇빛이 없고 서늘한 곳에 보관합니다.
- 투여중 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.

## 효소 소화제

- 중증 간질환, 담 폐쇄 환자는 복용하지 마십시오. (Oxbile)
- 7세미만 및 영·유아는 복용하지 마십시오. (Ammomium Glycyrrhizinate)
- 고혈압, 부종, 고령의 환자는 복용하지 마십시오. (Ammomium Glycyrrhizinate)

## 변비치료제

- 경련성 변비, 항문열창, 임신, 수유부 등은 복용하지 마십시오.
- 우유와 같이 섭취하지 마십시오.
- 취침 전에 투여하는 것이 좋습니다.

## 지사제 (Loperamide)

- 2세미만자는 복용하지 마십시오.
- 혈변 및 고열의 세균성 설사 환자는 복용하지 마십시오.
- 장폐색 등이 나타날 수 있습니다.

## 쌍회탕류

- 1일 3회 식전 또는 식간에 복용하십시오.
- 장기간 복용할 경우 부종, 체중증가 등이 나타날 수 있습니다
- 저칼륨혈증, 나트륨체액의 저류, 혈압상승 등이 나타날 수 있습니다.

## 해열진통제

- 매일 일정량 이상의 술을 마시는 사람은 간 손상이 유발될 수 있습니다. (acetaminophen)
- 피린계 부작용(과민증, 발진, 알레르기), 불면증 등이 나타날 수 있습니다.

## 소염진통제

- 소화성궤양, 심한 혈액이상(간장애, 신장애) 환자는 복용하지 마십시오.
- 심근경색, 뇌졸중, 천식환자는 주의하여야 합니다.

## 진경진통제


- 소화성궤양, 천식, 혈액이상 환자는 복용하지 마십시오.
- 신장애, 녹내장, 전립선비대, 부정빈맥, 마비성 장폐쇄 환자는 복용하지 마십시오.
- 위염, 위궤양, 위출혈환자는 주의하십시오.
- 음주자, 간장애환자는 복용하지 마십시오.



사단법인

대한약사회

# 일반약 복용지도 참고사항



## 감기약



- 졸릴 수 있으므로 운전 시에는 복용하지 마세요.
- 입이 마른 증상이 나타날 수 있습니다.
- 술을 마시면 졸리움이 심해질 수 있습니다.
- 노인의 경우 배뇨에 이상이 있을 수 있습니다.

## 간장약



- 이상증상이 나타나면 즉시 투여를 중지하고 상의하세요.
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 상의하세요.
- 투여 중에 간 기능 검사를 하여야 합니다.

## 칼슘제제



- 변비가 나타나면 복용을 중지하여야 합니다.
- 야외활동을 자주하는 분은 비타민 D의 섭취량을 줄여야 합니다.

## 피부연고제



- 눈에 들어가지 않도록 하십시오.
- 상처 또는 국소에만 바르세요.

## 구충제



- 임신 또는 임신 가능성이 있는 부인은 복용하지 마십시오.
- 현탁액은 알레르기를 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 구토, 속쓰림, 설사 등의 위장장애 또는 두통증상이 나타날 수 있습니다.
- 2세미만(24개월)에는 안전성이 확립되어 있지 않습니다.

## 임신 진단 시약



- 아침 첫 소변시 사용하는 것이 가장 좋습니다.
- 낮에 사용 시에는 검사 전 4~6시간 수분 섭취를 제한하십시오.

## 소독약 (포비돈요오드액)



- 박테리아, 진균, 바이러스, 원충 등의 살균소독에 사용합니다.
- 도포후 밴드를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 심한 화상이나 넓은 상처에는 사용하지 않습니다.

## 피부외용제 (Dibucain 함유)



- 30개월 이하의 유아에게는 사용하지 마십시오.
- 눈 주위, 점막부위에는 사용하지 마십시오.

## 머릿니 제거제



- 머리에 도포 후 10분을 넘기지 마십시오.
- 2세 이하 어린이, 임산부, 수유부 등은 사용하지 마십시오.

## 탈모 외용제 (Minoxidil제)



- 도포후 4시간 내에는 머리를 감지 마십시오.
- 취침전 4시간 이내에 도포하지 마십시오.
- 도포 후 드라이로 말리지 마십시오.

## 파스류



- 파스 붙인 채, 사우나나 찜질방 등에 가지 마십시오.
- 발진·발적 가려움 등의 증상이 나타나면 상의하세요.



사단법인

대한약사회